

ESPÉCIES DO VIVEIRO FLORESTAL UNIVERSITÁRIO

Para conhecer e/ou adquirir as espécies nativas-arbóreas, exóticas-arbóreas, medicinais e ornamentais-arbustos abaixo, entre em contato com o Viveiro Florestal Universitário, pelo telefone (49) 3321.8281 ou e-mail: viveiro@unochapeco.edu.br

Espécies Vegetais Nativas - arbóreas

| Nome popular | Nome científico | Família |
|------------------|--|---------------|
| Açoita-cavalo | <i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc. | Malvaceae |
| Aguai | <i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk | Sapotaceae |
| Araucária | <i>Araucaria angustifolia</i> | Araucareacea |
| Angico-branco | <i>Albizea polycephala</i> (Benth.) Kilip | Fabaceae |
| Angico-vermelho | <i>Parapitadenia rigida</i> (Benth.) Brenan | Fabaceae |
| Araçá | <i>Psidium cattleianum</i> Sabine | Myrtaceae |
| Araticum | <i>Rollinia sylvatica</i> (A. St.-hil.) Mart | Annonaceae |
| Aroeira-vermelha | <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi | Anacardiaceae |
| Batinga | <i>Eugenia rostrifolia</i> D. Lengrand | Myrtaceae |
| Bergamota | <i>Citrus</i> sp. | Rutaceae |
| Bracatinga | <i>Mimosa scabrella</i> Benth. | Fabaceae |
| Bugreiro | <i>Lithraea molleoides</i> | Anacardiaceae |
| Butiá | <i>Butia eriospatha</i> (Mart. ex. Drude) Becc. | Areaceae |
| Cabreúva | <i>Myrocarpus frondosus</i> Allem | Fabaceae |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Cafezeiro-do-mato | <i>Casearia silvestris</i> Sw. | Salicaceae |
| Cambará | <i>Gochnatia polymorpha</i> (less.) Carbr. | Compositae |
| Camboatã-branco | <i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk | Sapindaceae |
| Camboatã-vermelho | <i>Cupania vernalis</i> Cambess | Sapindaceae |
| Canafístula | <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub. | Fabaceae |
| Canela-amarela | <i>Nectandra lanceolata</i> Ness | Lauraceae |
| Canela-de-veado | <i>Helietta apiculata</i> Benth | Rutaceae |
| Canela-do-brejo | <i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel | Fabaceae |
| Canela-guaicá | <i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness | Lauraceae |
| Canela-sassafrás | <i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer | Lauraceae |
| Canjerana | <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart | Meliaceae |
| Capororoca | <i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze | Primulaceae |
| Caroba | <i>Jacaranda micrantha</i> Cham. | Bignoniaceae |
| Carvalho | <i>Roupala brasilienses</i> klotz. | Proteaceae |
| Catiguá | <i>Trichilia claussenii</i> C. DC. | Meliaceae |
| Cedro | <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | Meliaceae |
| Cerejeira | <i>Eugenia involucrata</i> DC. | Myrtaceae |
| Cocão | <i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.il | Erythroxylaceae |
| Corticeira-da-serra | <i>Erythrina falcata</i> Benth. | Fabaceae |
| Corticeira-do-banhado | <i>Erythrina crista-galli</i> L. | Fabaceae |

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| Erva-mate | <i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil. | Aquifoliaceae |
| Espinheira-santa | <i>Maytenus ilicifolia</i> (Schrad.) | Celastraceae |
| Esporão-de-galo | <i>Celtis ehrenbergiana</i> (Klotzsch) Liebm | Cannabaceae |
| Forquilha | <i>Peschiera fuchsiaefolia</i> Miers | Apocynaceae |
| Falso- barbatimão | <i>Cassia leptophylla</i> Vogel | Fabaceae |
| Grápia | <i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) | Fabaceae |
| Guabiju | <i>Myrcianthes pungens</i> (O. Berg) D. Legrand | Myrtaceae |
| Guaçatunga-branca | <i>Casearia decandra</i> Jacq. | Salicaceae |
| Guabiroba | <i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg | Myrtaceae |
| Guajuvira | <i>Cordia americana</i> (L) Gottschling & J.E.Mill. | Boraginaceae |
| Guamirim | <i>Myrceugenia miersiana</i> (Gardner) D. Legrand & Kausel | Myrtaceae |
| Guamirim-facho | <i>Calyptanthus concinna</i> DC. | Myrtaceae |
| Guamirim-pitangua | <i>Eugenia florida</i> | Myrtaceae |
| Guatambu | <i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl. | Rutaceae |
| Imbuia | <i>Ocotea porosa</i> (Ness) Barroso | Lauraceae |
| Ingá-banana | <i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn. | Fabaceae |
| Ipê-amarelo | <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex A.DC.) Mattos | Bignoniaceae |
| Ipê-roxo | <i>Handroanthus avellanadae</i> (Lorentz ex Griseb.) Mattos | Bignoniaceae |
| Jaborandi | <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem. | Rutaceae |

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Jabuticabeira | <i>Plinia trunciflora</i> (O. Berg) Kausel | Myrtaceae |
| Jameri | <i>Celtis iguanea</i> (jacq.) Sarg. | Cannabaceae |
| Jerivá | <i>Syagrus romanzoffiana</i> (cham.) Glassman | Arecaceae |
| Laranjeira | <i>Citrus</i> sp. | Rutaceae |
| Limão comum | <i>Citrus</i> sp. | Rutaceae |
| Limão-cravo | <i>Citrus</i> sp <i>limonia</i> Osbeck | Rutaceae |
| Limeira | <i>Citrus</i> sp. | Rutaceae |
| Louro-pardo | <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart | Boraginaceae |
| Mamão-do-mato | <i>Carica quercifolia</i> (St. Hill.) Hieron. | Caricaceae |
| Mamica-de-cadela | <i>Zanthoxylum petiolare</i> A. St.- Hil. & Tul. | Rutaceae |
| Maria-preta | <i>Diatenopteryx sorbifolia</i> Radlk | Sapindaceae |
| Maracujá | <i>Passiflora</i> sp | Passifloraceae |
| Marmeleiro | <i>Ruprechtia laxiflora</i> Meisn | Polygonaceae |
| Palmito-juçara | <i>Euterpes edulis</i> Mart. | Arecaceae |
| Pau-amargo | <i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl | Simaroubaceae |
| Pau-cigarra | <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae |
| Pau d'arco | <i>Guarea macrophylla</i> Vahl | Meliaceae |
| Peroba | <i>Aspidosperma australe</i> | Apocynaceae |
| Pessegueiro-bravo | <i>Prunus myrtifolia</i> L. Urb. | Rosaceae |

| | | |
|---------------|---|----------------|
| Pitangueira | <i>Eugenia uniflora</i> L. | Myrtaceae |
| Rabo-de-bugio | <i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth | Fabaceae |
| Sete Capote | <i>Campomanesia guazumifolia</i> | Myrtaceae |
| Sibipiruna | <i>Caesalpinia pluviosa</i> | Fabaceae |
| Tanheiro | <i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl. | Euphorbiaceae |
| Tarumã | <i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke | Lamiaceae |
| Timbó | <i>Ateleia glazioviana</i> Baill. | Fabaceae |
| Timbaúva | <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong | Fabaceae |
| Umbu | <i>Phytolacca dioica</i> L. | Phytolaccaceae |
| Urucum | <i>Bixa orellana</i> | Bixaceae |
| Uváia | <i>Eugenia pyriformis</i> | Myrtaceae |
| Vacum | <i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk | Sapindeceae |

Especies Vegetais Exóticas – arbóreas

| Nome Popular | Nome Científico | Família |
|-------------------|--|--------------------------|
| Acácia-mimosa | <i>Acacia podalyraefolia</i> A. Cunn. Ex G. Don | Fabaceae |
| Ameixa de inverno | <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. | Rosaceae |
| Amora-preta | <i>Morus nigra</i> L. | Moraceae |
| Canela-doce | <i>Cinnamomum</i> <i>Zeylanicum</i> Ness | Lauraceae |
| Flamboyant | <i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf. | Fabaceae |
| Fruta-do-conde | <i>Annoma squamosa</i> L. | Annomaceae |
| Goiaba-branca | <i>Psidium guajava</i> L. | Myrtaceae |
| Guaraná | <i>Paullinia cupana</i> Kunth | Sapindaceae |
| Jacarandá-mimoso | <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don | Bignoniaceae |
| Jambolão | <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | Myrtaceae |
| Jatobá | <i>Hymenaea courbaril</i> L. | Fabaceae |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Pata-de-vaca | <i>Bauhinia purpurea</i> L. | Fabaceae |
| Tipuana | <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze | Fabaceae |
| Uva-do-japão | <i>Hovenia dulcis</i> | Rhamnaceae |

Espécies Ornamentais/Arbustos

| Nome popular | Nome científico | Família |
|-----------------------|---|------------------------------|
| 11 horas | <i>Portulaca grandiflora</i> Hook. | Portulacaceae |
| Abélia | <i>Abelia grandifolia</i> Hort. ex L. H. Bailey | Caprifoliaceae |
| Arruda | <i>Ruta graveolens</i> | Rutaceae |
| Azaléia | <i>Rhododendron simsii</i> | Ericaceae |
| Brinco de princesa | <i>Fuchsia</i> | Onagraceae |
| Bromélia | | Bromeliaceae |
| Buxinho | <i>Buxus sempervirens</i> | Buxaceae |
| Caliandra | <i>Calliandra brevipes</i> | Fabaceae |
| Cipreste cerca-viva | <i>Cupressus lusitanica</i> Mill | Cupressaceae |
| Cipreste-italiano | <i>Cupressus sempervirens</i> L. var. <i>stricta</i> Aiton | Cupressaceae |
| Ligusto-chinês | <i>Ligustrum sinense</i> Variegatum | Moraceae |
| Hibisco-rosa | <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. | Malvaceae |
| Palmeira-fênix | <i>Phoenix roebelenii</i> | Arecaceae |
| Palmeira-imperial | <i>Roystonea oleracea</i> | Arecaceae |
| Physalis | <i>Physalis angulata</i> L. | Solanaceae |
| Pimenta-de-jardim | <i>Capsicum</i> sp. | Solanaceae |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Pimentão amarelo | <i>Capsicum annum</i> | Solanaceae |
| Pingo-de-ouro | <i>Duranta erecta</i> L. Gold Mound | Verbenaceae |
| Rosa | <i>Rosa</i> spp. | <u>Rosaceae</u> |
| Saia-roxa | <i>Datura metel</i> | Solanaceae |
| Tagete | <i>Tagetes erecta</i> | <u>Asteraceae</u> |
| Vinagreira | <i>Hibiscus sabdariffa</i> | <u>Malvaceae</u> |

Espécies medicinais

| Nome popular | Nome científico | Família |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| Alecrim | <i>Holocalyx balansae</i> Micheli | Fabaceae |
| Cânfora | <i>Artemisia camphorata</i> | <u>Asteraceae</u> |
| Cavalinha | <i>Equisetum</i> spp | <u>Equisetaceae</u> |
| Cidreira | <i>Cymbopogon citratus</i> | Poaceae |
| Falsa-melissa | <i>Lippia alba</i> (Mill.) N. E. Br. | Verbenaceae |
| Hortelã | <i>Mentha</i> sp | <u>Lamiaceae</u> |
| Lavanda | <i>Lavandula dentata</i> L. | Lamiaceae |
| Manjeriço | <i>Ocimum basilicum</i> | <u>Lamiaceae</u> |
| Melissa | <i>Melissa officinalis</i> | <u>Lamiaceae</u> |
| Orégano | <i>Origanum vulgare</i> | <u>Lamiaceae</u> |
| Quina-quina | <i>Coutarea hexandra</i> | Rubiaceae |
| Ora-pro-nobis | | Cactaceae |

Pereskia aculeata Mill.

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Poejo | <i>Mentha pulegium</i> L. | Lamiaceae |
| Tempero de carne | <i>Aloysia Triphylla</i> (L'Hérit) Britton | Verbenaceae |
| Tomilho | <i>Thymus vulgaris</i> | Lamiaceae |
| Três-marias | <i>Bougainvillea spectabilis</i> | Nyctaginaceae |



Espécies na cor vermelho : Espécies em produção (Não disponíveis)



Espécies na cor preto : Espécies disponíveis